

Liguster - Ligustrum



Die aus etwa 50 Arten bestehende Gattung umfasst Sträucher und Bäume aus Asien, Europa und Nordafrika, die nicht nur in jeder Art von Boden, an jedem beliebigen Standort anwachsen, sondern auch jedes Stutzen ohne Protest überstehen, was sie zu hervorragendem Bonsai macht. Viele Arten sind auch sehr dekorativ.

Die immergrünen bzw. sommergrünen Sträucher und kleinen Bäume wachsen sehr schnell und tragen im Sommer viele kleine, weisse teils wohlriechende Blüten. Aus den Blüten entstehen schwarze Beeren, die der Liguster nochmals interessant macht.

Es gibt sehr viele Sorten, die wegen ihrer Wuchsform, der besonders geformten Blätter und unterschiedlichen Farben sehr interessant sind:

Ligustrum ovalifolium, Ovalblättriger Liguster. Dieser aus Japan stammende Liguster hat ovale Blätter und ist halb-immergrün.

Ligustrum ovalifolium Aureum, panaschierte Sorte, gelb-grün sehr hübsch.

Ligustrum vulgare, Gemeiner Liguster, ein halb-immergrüner Strauch mit dunklen, glänzenden Blättern.

Ligustrum nitida, als Zimmerbonsai sehr bekannt.

Ligustrum vulgare Lodense, dicht verzweigter Strauch, etwa 1 m hoch mit tiefgrüner Belaubung, hervorragend als Bonsai geeignet.

Standort: Hell, vor praller Sonne schützen, im Sommer am besten im Freien aufstellen. Im Winter möglichst um die 15°C.



Gestaltung/Stilarten: Alle Liguster sind gut schnittverträglich und alle Stilarten können ausprobiert werden.

Giessen: An heißen Tagen im Sommer reichlich giessen. Im Winter nur sparsam giessen, aber nicht austrocknen lassen.

Düngen: Von März bis Ende September wöchentlich mit Bonsai-Flüssigdünger auf nicht trockenen Boden düngen. Im Winter einmal im Monat düngen.



Schnitt: Jungpflanzen mehrmals stutzen. Im Winter werden die grösseren Äste, die nicht brauchbar sind, weggeschnitten. Sonst durch den Schnitt die Form behalten.

Drahten: Ist kein Problem, nur vorsichtig mit den relativ weichen Ästen umgehen. Am besten gleich nach dem Blattschnitt im Juni. Nach einem halben Jahr wieder entfernen, nicht einwachsen lassen.

Umtopfen: Alle drei bis fünf Jahre im zeitigen Frühjahr umtopfen. Alle Liguster vertragen einen Wurzelschnitt. Eine Mischung aus Zweidrittel Bonsaierde, Eindrittel Akadamaerde hat sich bewährt.

Wachstumsstörungen: Die Blätter hellen auf, die Blattnerven erscheinen dunkler als die Blattfläche. Hier haben wir es mit Chlorose oder Eisenmangel zu tun. Wird noch gerne durch kalkhaltiges Wasser oder durch zu häufiges Giessen verursacht. Weniger Giessen oder kalziumarmes Mineralwasser zum Giessen nehmen. Abhilfe schaffen auch ein oder zwei Giesbehandlungen mit Eisendünger.

Die Kronenmitte wird kahl, die Zweige trocknen ein. Wird oft durch zu wenig Wasser verursacht. Kann auch sein, dass der Wurzelballe total durchwurzelt ist und kein Wasser mehr im Substrat gespeichert werden kann. Sofort umtopfen. Der Liguster reagiert am Anfang bei Wassermangel mit einem schlaffen Herunterhängen der jungen Blätter. Im Notfall ein Wasserbad geben. Immer reichlich giessen, aber keine Staunässe.

Pflanzenschutz: Zweigsterben - An Zweigen und Stämmchen verfärbt sich die Rinde rötlichbraun, bildet eingesunkene Stellen, diese reissen auf, und führen zum Absterben.

Fliedermotte - In Blättern blasige Minen durch Minierfrass der Raupen, bei starkem Befall Braunfärbung.

Ligusterblattlaus.

Weisse Fliegen. Gelbsticker einsetzen.

Falscher Mehltau; zahlreiche, kleine hellbraune Flecken auf Blättern, welche einschrumpfen und abfallen.

Dickmaulrüssler,

Schildläuse.

Siehe Kapitel : [Pflanzenschutz](#)

Überwinterung: Liguster sind bis ca. minus 15° C winterfest, sollten aber vor Frost und kalten Winden geschützt werden.

Galerie



Sie dürfen diesen Text und Bilder für Ihren privaten Gebrauch ausdrucken. Die unveränderte Verwendung auf privaten Internetseiten ist nur mit einem Hinweis auf unser Urheberrecht und einem Link zu unserer Homepage www.bonsaipflege.ch erlaubt. Die Verwendung auf kommerziellen Seiten ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erlaubt.

bonsaipflege.ch